

NORME DI PREPARAZIONE

BREATH TEST UREA 13C

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAZIENTE:

La mattina del test dovrà osservare il digiuno completo, non dovrà lavarsi i denti e non potrà fumare.

Nelle tre settimane precedenti l'esame non dovrà assumere farmaci antibiotici e nella settimana precedente non dovrà assumere farmaci gastroprotettori presenti in elenco:

ANTEPSIN (Sucralfato), PANTOPAN (Pantoprazolo), ANTRA (Omeprazolo), PANTORC (Pantoprazolo), AXAGON (Esomeprazolo), PARIET (Rabeprazolo), BIOMAG (Cimetidina), PEPTAZOL (Pantoprazolo), BRUMETIDINA (Cimetidina), PEPTIREX (Lansoprazolo), BUSCOPAN ANTIACIDO (Ranitidina), PERGASTRID (Lansoprazolo), CRAFILM (Sucralfato), RANIBEN (Ranitidina), CRONIZAT (Nizatidina), RANIBLOC (Ranitidina), ERMES (Lansoprazolo), RANIDIL (Ranitidina), ESOPRAL (Esomeprazolo), ROXIT (Roxatidina), ETIDEME (Cimetidina), SENSIGARD (Ranitidina), EUGRASTRAN (Lansoprazolo), SUCRALFIN (Sucralfato), FAMODIL (Famotidina), SUCRAMAL (Sucralfato), FRILANS (Lansoprazolo), SUCRATE (Sucralfato), GASTRALGIN (Roxatidina), SUCRORIL (Sucralfato), GASTROGEL (Sucralfato), SURIL (Sucralfato), LANSOX (Lansoprazolo), TAGAMET (Cimetidina), LEVOGENIX (Lansoprazolo), TEMIC (Cimetidina), LIMPIDEX (Lansoprazolo), ULCEDIN (Cimetidina), LOMEVEL (Lansoprazolo), ULCEX (Ranitidina), LOSEC (Omeprazolo), ULCRAST (Sucralfato), LUCEN (Esomeprazolo), ULIS (Cimetidina), MEPRAL (Omeprazolo), ZANTAC (Ranitidina), MOTIAX (Famotidina), ZOTON (Lansoprazolo), NEOH 2 (Roxatidina), NEXIUM (Esomeprazolo), NIZAX (Nizatidina), OMEPRAZEN (Omeprazolo), PANTECTA (Pantoprazolo), PANTOLOC (Pantoprazolo)

DURATA DEL TEST: 15 minuti circa.

NORME DI COMPORTAMENTO:

Una volta espirato nel primo campione (tempo zero), le verranno somministrate due compresse di Urea da 37.5 mg. Successivamente dovrà restare in attesa, seduto, senza fumare, senza mangiare nè bere per dieci minuti. Al termine del tempo stabilito le verrà chiesto di espirare nuovamente in una provetta (tempo 10)